


STOP


ROMÂNIA în 2016: 12790 cazuri noi și recidive (64,9‰), 1100 decese prin TB.

INFECȚIA TB



Infecția TB latentă

Infecția TB latentă este starea în care bacilul există în organism, dar persoana respectivă nu are simptome și nu poate transmite microbul.



TB

Dacă germeii care provoacă TB devin activi și se multiplică, apare boala.




1 din 10

Fără tratament, 1 din 10 persoane cu TB latentă dezvoltă boala.

OAMENII CARE TREBUIE TESTAȚI PENTRU DEPISTAREA TB:



Contactii cu persoane bolnave de TB



Persoane care provin din țări cu morbiditate crescută prin TB



Persoane care prezintă afecțiuni ce cresc susceptibilitatea la TB



SPITALE

ADĂPOSTURI

FACILITĂȚI CORECȚIONALE

Persoane care petrec timp în unități în care TB este mai comună.

TRATAMENTUL INFECȚIEI TB LATENTE PREVIN BOALA



TESTUL CUTANAT

TEST DE SÂNGE

Testul de sânge sau testul cutanat pot depista TB.



Schemele de tratament trebuie respectate cu strictețe, pentru a preveni evoluția spre boala activă.

\$18000

TRATAREA BOLII

TRATAREA INFECȚIILOR LATENTE

\$600

Tratamentul formelor latente este mai ieftin decât cel al bolii.

ELIMINAREA TB NECESITA EXTINDEREA TESTĂRIILOR ȘI TRATAMENTUL TB LATENTE.



Implicarea comunităților afectate și a furnizorilor de servicii medicale din acestea.



Promovarea testelor și tratamentelor eficiente



Nu neglijați TB latentă!

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) asigura implementarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei 2015-2020.